



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ
BULAŞICI HASTALIKLAR VE AŞILANMA BİLGİLENDİRME FORMU

Hemşirelik eğitimi veren okulların öğrencileri ve eğitimleri döneminde sağlık kuruluşlarında uygulamalı eğitim ve staj yapanlar, sağlık personelinde olduğu gibi bulaşıcı hastalıklar için artmış riske sahiptirler. Bu nedenle aşağıda belirtilen aşılı yapılmaları gereklidir. İlgilinin aşı uygulanmadan önce hekim tarafından değerlendirilmesi ve aşı kontrendikasyonları (yumurta anafilaksisi, KKK ve suçiçeği gibi canlı aşılı için gebelik, ağır immün yetmezlik, immün supresif tedavi vb.) konusunda dikkatli davranılması gerekmektedir. Aşılama öncesinde gerekli olan serolojik tetkikler (HBs Ag, HBs Ab, HbC IgM, HCV Ab, Su Çiçeği Virüsü IGG, Rubella virüs IgG, Kızamık Virüsü IgG, Kabakulak Virüsü IgG, HIV 1+2 AB, HAV IgG) herhangi bir Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ya da Dahiliye polikliniğinden yaptırılabilir. Aşılama yapılması için serolojik test sonuçlarınız ile Aile Hekimliği Polikliniğine başvurabilirsiniz. Doktor değerlendirmesi ile eksik aşılılarınızı belirlenecek ve yaptırmanız gereken aşılı size iletilecektir. Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin bulaşıcı hastalıklara karşı aşılılarını yaptırmaları genel sağılıklarının korunması açısından önemlidir. Aşı yaptırmayan öğrencilerin aşı yaptırmamaları nedeniyle klinik uygulamaları süresince zorunlu eğitimlerinin bir parçası olarak klinik uygulamalar da risk altında kalmaları mümkündür. Klinik uygulamaları süresince bilgi verilmiş olmasına rağmen aşılılanmayan öğrencilerin bu nedenle oluşabilecek sağılı sorunlarından Fakültemiz sorumlu değildir. Aşılılar ve uygulanması gereken dozları aşağıda yer almaktadır.

Erişkin Tıp Difteri Tetanoz (Td) Aşılılaması

- Daha önce aşılılanma durumu kayıtlı olmayan tüm sağılı çalışanlarının 3 doz Td aşılı ile aşılılanarak primer immünizasyonlarının tamamlanması gerekmektedir (birinci doz ile ikinci doz arasında en az 1 ay, ikinci doz ile üçüncü doz arasında en az 6 ay).
- Primer serisi tamamlanan tüm sağılı çalışanlarına 10 yılda bir Td aşılı yapılmalıdır.

KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) Aşılılaması

- Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarını geçirdiklerine dair kayıtları olanlara veya laboratuvar tetkikleri ile bağışık olduğu gösterilenlere aşı uygulanmasına gerek yoktur.
- En az 1 ay ara ile iki doz KKK aşılı önerilir.

Suçiçeği Aşılılaması:

- Suçiçeği geçirdiğine ilişkin öyküsü olanlara aşı uygulanmasına gerek yoktur.
- Suçiçeği geçirdiğine ilişkin öyküsü bulunmayan veya aşı kaydı olmayan kişilerin aşılama öncesinde antikor düzeylerinin değerlendirilmesi gereklidir.
- Suçiçeği aşılı uygulaması (13 yaş ve üzerinde 2 doz önerildiği için) en az 4 hafta ara ile 2 doz şeklinde yapılmalıdır.

Hepatit A Aşılılaması

- Hep-A aşılılaması öncesinde antikor düzeylerinin değerlendirilmesi gereklidir.
- 6 ay ara ile iki doz uygulanmalıdır.

Hepatit B Aşılılaması

- Hep-B aşılı uygulanmadan önce hepatit B'ye yönelik serolojik inceleme (HBsAg, anti-HBs, anti-HbC total) yapılması önerilir.
- Hep B aşılı şeması 0, 1, 6 ay şeklinde 3 dozdur. Anti-HBs en az 10 mIU/mL ise kişi bağışiktir

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi eğitimi süresince klinik uygulamaları esnasında enfeksiyon hastalıklarından korunmak amacı ile aşı yaptırmalarının önemi hususunda bilgilendirildim.

El yazısı ile **OKUDUM, ANLADIM, ONAYLIYORUM** yazınız.

TARİH:

ADI SOYADI:

İMZA: