

Hemşirelik eğitimi veren okulların öğretim elemanları, öğrencileri ve eğitimleri döneminde sağlık kuruluşlarında uygulamalı eğitim ve staj yapanlar, sağlık personelinde olduğu gibi bulaşıcı hastalıklar için artmış riske sahiptirler. Bu nedenle aşağıda belirtilen aşıları yaptırmaları gereklidir. İlgilinin aşı uygulanmadan önce hekim tarafından değerlendirilmesi ve aşı kontrendikasyonları (yumurta anafilaksisi, KKK ve suçiçeği gibi canlı aşılardan gebelik, ağır immün yetmezlik, immün supresif tedavi vb.) konusunda dikkatli davranılması gerekmektedir. Aşılamaya öncesinde gerekli olan serolojik tetkikleri (HBs Ag, HBs Ab, HBc IgM, HCV Ab, Su Çiçeği Virüsü IGG, Rubella virüs IgG, Kızamık Virüsü IgG, Kabakulak Virüsü IgG, HIV 1+2 AB, HAV IgG) herhangi bir Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ya da Dahiliye polikliniğinden yaptırabilirsiniz. Aşılamaya yapılması için serolojik test sonuçlarımız ile kendi **Aile Hekimliğinize** ya da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi **H Blok Aile Hekimliği Polikliniğine** başvurabilirsiniz. Doktor değerlendirmesi ile eksik aşılarınız belirlenecek ve yaptırmanız gereken aşılar size iletilecektir. Aile Hekimliği birimleri içinde yer alan aşı odasında dozlarınızı tamamlayabilirsiniz. **Kan tetkiklerinizin ve varsa eksik aşılarınızın 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ekle-sil haftasına kadar (10 Şubat 2025) yapılması gerekmektedir.** Ülkemizin içinde bulunduğu şartlardan dolayı zaman zaman aşı temininde sıkıntılar yaşanabilmektedir. Böyle bir durumda eksik aşılarınızı ücretli olarak satın alıp Aile Hekimliğinizde yaptırma seçeneğiniz de bulunmaktadır. Herhangi bir aşı kaydınız varsa muayenelerde iletmeniz yarar sağlayacaktır.

Aşılar ve uygulanması gereken dozları aşağıda yer almaktadır.

#### **Erişkin Tip Difteri Tetanoz (Td) Aşılması**

- Daha önce aşılanma durumu kayıtlı olmayan tüm sağlık çalışanlarının 3 doz Td aşısı ile aşılanarak primer immünizasyonlarının tamamlanması gerekmektedir (birinci doz ile ikinci doz arasında en az 1 ay, ikinci doz ile üçüncü doz arasında en az 6 ay).
- Primer serisi tamamlanan tüm sağlık çalışanlarına 10 yılda bir Td aşısı yapılmalıdır.

#### **KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) Aşılması**

- Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarını geçirdiklerine dair kayıtları olanlara veya laboratuvar tetkikleri ile bağışık olduğu gösterilenlere aşı uygulanmasına gerek yoktur.
- En az 1 ay ara ile iki doz KKK aşısı önerilir.

#### **Suçiçeği Aşılması:**

- Suçiçeği geçirdiğine ilişkin öyküsü olanlara aşı uygulanmasına gerek yoktur.
- Suçiçeği geçirdiğine ilişkin öyküsü bulunmayan veya aşı kaydı olmayan kişilerin aşılamaya öncesinde antikor düzeylerinin değerlendirilmesi gereklidir.
- Suçiçeği aşısı uygulaması (13 yaş ve üzerinde 2 doz önerildiği için) en az 4 hafta ara ile 2 doz şeklinde yapılmalıdır.

## **Hepatit A Aşılması**

- Hep-A aşılması öncesinde antikor düzeylerinin değerlendirilmesi gereklidir.
- 6 ay ara ile iki doz uygulanmalıdır.

## **Hepatit B Aşılması**

- Hep-B aşısı uygulanmadan önce hepatit B'ye yönelik serolojik inceleme (HBsAg, anti-HBs, anti-HBc total) yapılması önerilir.
- Hep B aşısı şeması 0, 1, 6 ay şeklinde 3 dozdur. Anti-HBs en az 10 mIU/mL ise kişi bağışıktır

Kaynak: <https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/saglik-calisanlari-asilama.html> Sağlık Çalışanlarına Yönelik Uygulanması Gerekli Aşılar ve Uygulama Şemaları. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı. Tarih: 2017

<https://www.saglik.gov.tr/TR,11080/genisletilmis-bagisiklama-programi-genelgesi.html> Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 2008/14 Sayılı Genelge. Tarih: 25.02.2008

Erişkin Tip  
Difteri Tetanoz  
(Td) Aşılması

- Öncelikle kayıt (aşı kartı ya da e nabız gibi sistem kaydı) incelenir.
- Kayıtlı olmayan tüm sağlık çalışanlarının 3 doz Td aşısı (0., 1., 7. ay) ile primer immünizasyonu yapılır
- Primer immünizasyonu tamamlananlara 10 yılda bir Td aşısı yapılır.

KKK (Kızamık,  
Kızamıkçık,  
Kabakulak)  
Aşılması

- Öncelikle kayıtlar (aşı kartı ya da e nabız gibi sistem kaydı) incelenir.
- Kayıtlı olmayanlara serolojik test gereklidir.
- Bağışık olmayanlara en az bir ay arayla iki doz KKK aşısı yapılır.

Suçiçeği Aşılması

- Suçiçeği geçirdiğine ilişkin öyküsü olanlara aşı uygulanmasına gerek yoktur.
- Suçiçeği öyküsü ve aşı kayıtları (aşı kartı ya da e nabız gibi sistem kaydı) olmayanlara serolojik test gereklidir.
- Bağışık olmayanlara en az dört hafta arayla iki doz KKK aşısı yapılır

Hepatit A Aşılması

- Hep-A aşılması öncesinde serolojik test ile antikor düzeylerinin değerlendirilmesi gereklidir
- Bağışık olmayanlara 6 ay ara ile iki doz yapılır.

Hepatit B Aşılması

- Hep-B aşılması öncesinde serolojik test (HBsAg, anti-HBs, anti-HBc total) ile değerlendirilmesi gereklidir
- Anti-HBs en az 10 mIU/mL ise kişi bağışıklıdır.
- Bağışık olmayanlara Hepatit B aşı şeması 0, 1, 6 ay şeklinde 3 dozdur.

Kaynak: <https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/saglik-calisanlari-asilama.html> Sağlık Çalışanlarına Yönelik Uygulanması Gerekli Aşılar ve Uygulama Şemaları. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenbilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

<https://www.saglik.gov.tr/TR,11080/genisletilmis-bagisiklama-programi-genelgesi.html> Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 2008/14 Sayılı Genelge. Tarih: 25.02.2008