

HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

ETHYLEX 50 mg film tablet

- **ETHYLEX, 50 mg naltrekson hidroklorür içeren, bej renkli, oval şekilli, film kaplı tabletler şeklindedir.**
- **ETHYLEX, alkol ve opiyat (Eroin) bağımlılığının çok yönlü tedavisinde kullanılan bir ek tedavidir.**
- **ETHYLEX bağımlılığa neden olmaz.**
- **ETHYLEX'le tedavi sonucunda alkol veya opiyat alma isteği düştüğü için, alkol veya opiyat alımı yok olur.**
- **ETHYLEX'in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Aç ya da tok karnına alınabilir.**
- **ETHYLEX karaciğer ve böbrekler aracılığı ile uzaklaştırılır. Doktorunuz, tedavinizden önce ve tedaviniz süresince özellikle karaciğer fonksiyon testleri uygulayacaktır.**

ETHYLEX'İ AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA KULLANMAYINIZ

- **Naltrekson'a ya da ilacın içeriğindeki laktoza ya da diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,**
- **Opiyat kullanıyorsanız,**
- **Opiyatlar için idrar testiniz pozitifse,**
- **Ciddi karaciğer ya da böbrek problemleriniz varsa,**
- **ETHYLEX tableti uyuşturucu madde ve benzodiazepin benzeri yeşil reçeteli ve SUBOXONE gibi kırmızı reçeteli ilaçlarla birlikte kullanmayınız.**

✿ DİKKAT!

- **GEBELİK: Ethylex kullanmaya başlamadan önce doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile olduğunuzdan şüphe ettiğinizi söyleyiniz.**
- **Herhangi bir nedenle anestezi almanız(ameliyat, diş çekimi vs.)gerekirse doktorunuzu ETHYLEX kullandığımız konusunda bilgilendiriniz.**

➤ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

- **SUBOXONE® (buprenorphine HCl / naloxone HCl dihydrate, sublingual tablet)**
- SUBOXONE, opiat (eroïn) bağımlılığında kullanılan **kırmızı reçete** ile yazılan kontrole tabi bir ilaçtır.
- SUBOXONE, danışmanlık veya davranış terapisini de içeren eksiksiz bir **bağımlılık tedavi programının parçasıdır.**
- Reçetesiz-illegal satın alınmamalıdır.
- SUBOXONE iki kısım ilaç içeren bir tablettir.
- 1.İlk kısmına **BUPRENORFİN** denir ve opioid bağımlılığının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
- 2. Diğer kısım da **NALOKSON**'dur.
- SUBOXONE'nun kötüye kullanımını engellemek için tabletin içine konulmuştur.
- İdrarda eroïn ya da başka opiatlar, alkol ve benzodiazepin ilaçları çıkmadığı zaman SUBOXONE başlanır; bunların vücutta birlikte olmasının çeşitli riskleri vardır.
- İlaça başlamadan önce kanda opiat ve benzeri maddeler kalmamalıdır. Aksi takdirde yoksunluk krizi daha şiddetli olacaktır.
- Doktorunuzun talimatlarını tam olarak uygulayınız. Doktorunuz ilacın sizi nasıl etkilediğini gördükten sonra dozunu değiştirebilir. İlacın dozunu doktorunuz uygun görmedikçe değiştirmeyiniz.

- SUBOXONE hem kısa süreli hem de uzun süreli kullanım için uygun bir ilaçtır. Doktorunuz gerekli görürse uzun dönem kullanımını da planlanabilir.
- Doktorunuzun uygun görmesi sonrası kriziniz başladığında tabletleri dilinizin altına koyun ve eritin.
- Bu işlem 2-10 dakika sürer. Tabletleri çiğnemeyin ya da yutmayın. İlaç bu şekilde işe yaramaz ve yoksunluk belirtileri görebilirsiniz. İlacı aldıktan sonra 10 dakika boyunca sıvı içmeyiniz.

✱ **DİKKAT!**

- SUBOXONE'ı kesinlikle enjekte ETMEYİNİZ. Hayati risk vardır ve ciddi yoksunluk belirtilerine neden olabilir.
- İlacın gebelikte kullanılmaması gerekmektedir.
- Herhangi bir nedenle (ameliyat, diş çekimi vs.) anestezi almanız gerekirse SUBOXONE kullandığınız konusunda doktorunuzu bilgilendiriniz.
- **SUBOXONE KULLANIRKEN KESİNLİKLE UYARICI/UYUŞTURUCU HERHANGİ BİR MADDE KULLANMAYINIZ!**